




**Boletín Epidemiológico N° 16 de 2026**  
**Dirección de Vigilancia de la Salud**  
**Ministerio de Salud**  
08 de mayo de 2026

**Tabla de contenido**

<b>Arbovirosis</b> .....	3
<b>Situación de la malaria en Costa Rica</b> .....	6
<b>Acciones de control vectorial realizadas en el país</b> .....	13
<b>Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19</b> .....	14
<b>Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 04 de mayo 2026</b> .....	28
<b>Infecciones de transmisión sexual</b> .....	34
<b>Miasis por gusano barrenador en humanos</b> .....	41



## Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024





## Arbovirosis

### Dengue

A la semana epidemiológica 16 del año 2026 se notifican **851 casos** de dengue de estos **12 casos** como dengue con signos de alarma.

La región Chorotega presenta el mayor número de casos notificados 196, y la región con la tasa más alta con 41,3/100.000 habitantes.

**Tabla 1.**

**Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 16, 2026 (Tasa por 100.000 hab.)**

Región	Casos	Tasa
Chorotega	196	41,3
Central Sur	161	10,6
Huetar Caribe	148	32,3
Central Norte	127	12,1
Pacífico Central	116	36,0
Central Este	37	6,7
Brunca	33	9,3
Huetar Norte	21	7,7
Central Occidente	12	5,3
<b>Total</b>	<b>851</b>	<b>16,3</b>

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.



**Tabla 2.**  
**Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2026**

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
Guanacaste	192	46,0	94	45,4	98	46,6
San José	165	9,9	78	9,2	87	10,6
Limón	148	32,3	68	30,4	80	34,2
Puntarenas	142	27,9	59	23,4	83	32,3
Alajuela	111	10,3	52	9,6	59	10,9
Heredia	57	10,4	27	9,8	30	10,9
Cartago	36	6,7	19	7,1	17	6,4
<b>Total</b>	<b>851</b>	<b>16,3</b>	<b>397</b>	<b>15,2</b>	<b>454</b>	<b>17,4</b>

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 16 son: San José 70 casos, Carrillo 57 casos, Puntarenas 54 casos, Limón 49 casos y Alajuela 45 casos.


**Tabla 3.**  
**Costa Rica: cantones prioritarios de dengue por tasa/100.00 habitantes a la semana epidemiológica 16, 2026.**

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	70	19,8
505: Carrillo	57	112,9
601: Puntarenas	54	37,1
701: Limón	49	53,4
201: Alajuela	45	13,6
702: Pococí	43	27,3
510: La Cruz	32	112,8
501: Liberia	30	36,3
705: Matina	30	65,7
506: Cañas	25	76,0

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud



**Gráfico 1.**  
**Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 16, 2025-2026.**



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 15 del 2025 se notificaron 1173 casos acumulados, para una reducción a la misma semana del 2026 del 27,5%.

La Gerencia Médica de la CCSS a través del Área de Estadística en Salud según los datos recopilados mediante EDUS informa que al 4 de mayo no reportan personas hospitalizadas con dengue.



# Situación de la malaria en Costa Rica

actualización a la semana epidemiológica 16 del 2026

## Situación actual casos de transmisión Local (Autóctonos/ Introducidos)

A la semana epidemiológica 10 del presente año, se reportan seis (6) casos autóctonos de *Plasmodium vivax* en la Región Huetar Norte, vinculados principalmente al foco de Crucitas, asociado a actividades de minería en Cutris en las localidades El Roble y El Camen, y al foco de Los Chiles, específicamente en la localidad de Medio Queso.

Adicionalmente, se reportan ocho (8) casos introducidos del foco de Crucitas en el distrito de Cutris y la localidad de Las Crucitas y El Roble. El histórico de transmisión local de malaria en Costa Rica evidencia una tendencia sostenida a la disminución de casos en los últimos cuatro años en comparación con el mismo periodo, como se evidencia en la tabla 1 y en la figura 1.

**Tabla 1.**

**Cantidad de casos de transmisión local (introducidos y autóctonos) a la semana epidemiológica actual y al cierre del año de los últimos 4 años. Costa Rica.**

Año	Cantidad de casos de transmisión local
2023	538
2024	244
2025	29
2026	14


Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Esta tendencia positiva refleja el impacto de las intervenciones dirigidas a la interrupción de la transmisión local, especialmente en los focos históricos.



### Gráfico 1.

#### Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024, 2025 y 2026, Costa Rica.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

A la semana epidemiológica actual, además de los casos de transmisión local previamente descritos, se registran **17 casos importados de malaria**, correspondientes a *Plasmodium vivax* (n=16) y *Plasmodium falciparum* (n=1). Estos casos fueron detectados principalmente en las localidades de Crucitas, El Roble y Chamorro, en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, asociadas al foco de Crucitas en la Región Huetar Norte.

Todos los casos importados en esta región presentan antecedente de actividad minera y nexo epidemiológico con Nicaragua. Asimismo, se incluye un caso importado procedente de San Carlos, Nicaragua, detectado en Cahuita, Talamanca.

Se reporta además un caso de recaída en un paciente con antecedente de infección importada en el año 2025, identificado en el distrito de San Ramón, con antecedente de migración desde Suramérica.

Finalmente, se encuentra en estudio un caso adicional por *P. vivax*, detectado en Horquetas de Sarapiquí.

En total, se registran 34 casos de malaria, considerando todas las clasificaciones.



**Tabla 2.**  
**Resumen de casos de todas las clasificaciones por Región y especie. Costa Rica, SE16.**

Región	Número de casos	Clasificación	Especie	Foco
Huetar Norte	17	Importado	<i>P. vivax</i> (N=16) <i>P. falciparum</i> (N=1)	Crucitas
	6	Autóctono	<i>P. vivax</i>	Crucitas (N=4) y Los Chiles (N=2)
	8	Introducidos	<i>P. vivax</i>	Crucitas
Central Occidente	1	Recaída de un caso importado 2025	<i>P. vivax</i>	Sin foco, Detectado en San Ramón
Huetar Caribe	1	Importado	<i>P. vivax</i>	Sin foco, Detectado en Talamanca
Central Norte	1	En estudio	<i>P. vivax</i>	Horquetas, Sarapiquí

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica. Nota: La clasificación epidemiológica corresponde al cierre de la semana epidemiológica actual de 2026 y puede modificarse conforme avance la investigación epidemiológica de los casos en estudio.

### Vigilancia Nacional

A la semana epidemiológica actual, el país reporta un total de **66.150 pruebas de diagnóstico de malaria**, resultado del esfuerzo interinstitucional para la detección oportuna de casos.

El **Ministerio de Salud registra 40.436 pruebas realizadas**, distribuidas en las diferentes Áreas Rectoras que presentan riesgo de introducción o reintroducción de la malaria. Estas corresponden principalmente a actividades de búsqueda reactiva y búsqueda proactiva, en el marco de las acciones de vigilancia intensificada, así mismo 496 pruebas han sido realizadas por colaboradores voluntarios, referirse a la figura 2.

Por su parte, la **Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha realizado un total de 25.714 pruebas** en el contexto de búsqueda pasiva, distribuidas de la siguiente manera:


- 22.759 pruebas rápidas de diagnóstico (PDR),
- 2.803 exámenes de gota gruesa,
- 152 prueba de Detección de la Cadena de Polimerasa (PCR) para malaria



Este abordaje articulado fortalece la capacidad de detección temprana, confirmación diagnóstica y respuesta oportuna ante casos importados o autóctonos, en el contexto de la estrategia nacional de eliminación de la malaria.

### Gráfico 2.

**Costa Rica: Distribución de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) de malaria realizadas por los funcionarios del Ministerio de Salud por Área Rectora de Salud (ARS) y Colaboradores Voluntarios, Semana Epidemiológica actual.**




Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica



### Gráfico 3. Costa Rica: Distribución de Gota Gruesa, PDR y PCR para malaria realizadas por Centro de Salud CCSS – SE 16.

Gota Gruesa y PDR Malaria por Centro de Salud CCSS




Fuente: Datos consolidados de producción de la Caja Costarricense del Seguro Social

### Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 5 focos activos, 12 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.



**Figura 1.**  
**Distribución geográfica de focos de malaria según estatus epidemiológico.**  
**Costa Rica, diciembre 2025.**



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.



**Tabla 3.**  
**Listado de focos de malaria por provincia, cantón y estado epidemiológico del foco. Costa Rica, diciembre 2025**

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Río Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Residual inactivo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.



## Acciones de control vectorial realizadas en el país en la semana epidemiológica 16

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la semana epidemiológica 16 del 2026, por el personal de Control de Vectores del país.

**Tabla 1.**  
**Costa Rica: Acciones de control vectorial en la semana epidemiológica 16**

Acciones realizadas	Total
Viviendas visitadas	12.119
Viviendas positivas	414
Depósitos tratados	38.807
Depósitos eliminados	18.717
Depósitos positivos	624
Viviendas fumigadas	5.489

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

**Tabla 2.**  
**Costa Rica: Consolidado de control vectorial de la semana 1 a la 16 de 2026**

Acciones realizadas	Total
Viviendas visitadas	201.328
Viviendas positivas	6.929
Depósitos tratados	680.758
Depósitos eliminados	333.157
Depósitos positivos	11.690
Viviendas fumigadas	175.484

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.



## Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19


A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 16 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 16 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 16 son un total de 3079.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños de 1 a 4 años y en los mayores de 75 años.

### Gráfico 1.

**Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 16, en Costa Rica, 2026.**



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.




Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños de 1 a 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).

En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 16, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Huetar Norte, la Brunca y la Central Este; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

### Gráfico 2.

**Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 16 del 2026, en Costa Rica.**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 16 del año 2026.



### Gráfico 3.

Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 16, en Costa Rica, 2026.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2026, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

### Gráfico 4.

Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2026.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.



El HNN, para la SE-16 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de seguridad, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

**Gráfico 5.**  
**Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2026**



Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2026.


En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 16 son 416171.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en niños entre 1 y 4 años y niños entre 5 y 9 años.



**Gráfico 6.**

**Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 16, en Costa Rica, 2026.**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 16, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central, Huetar Caribe, Huetar Norte y Chorotega. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Norte, Central Sur, Central Este, Occidente y Brunca.



### Gráfico 7.

Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 16 del 2026, en Costa Rica.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado en la semana epidemiológica 16 del año 2026.

### Gráfico 8.

Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 16, en Costa Rica, 2026.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.



En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2026, esto se puede apreciar en el gráfico 9.


**Gráfico 9.**  
**Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2026.**



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 16 se encuentran en la zona de éxito actualmente.

**Gráfico 10.**  
**Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2026.**



Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2026




En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 16 son  $n= 4903$ .
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 25 y 29 años y las personas entre 30 y 34 años.

### Gráfico 11.

**Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 16, en Costa Rica, 2026.**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 16, presentando mayor cantidad de casos en la región Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Pacífico Central, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Central Norte, Huetar Caribe y Brunca.



### Gráfico 12.

Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 16 del 2026, en Costa Rica.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2026.

### Gráfico 13.

Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 16, en Costa Rica, 2026.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.



En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2026, esto se puede apreciar en el gráfico 14.


**Gráfico 14.**  
**Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2026.**



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 17 del 2026; para la SE-17, en el país, el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del virus de Influenza A y finalmente el virus de Parainfluenza está en tercer lugar de circulación.

**Gráfico 15.**  
**Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 17 en Costa Rica, 2026.**



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2026.




En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 18 del año 2026 es la siguiente:

Al 4 de mayo del año en curso, correspondiente a la semana 18, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 62, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 91.04%.

### Gráfico 16.

#### Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 18 del año 2026, Hospital Nacional de Niños.



Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2026.

### Tabla 1.


#### Positividad de muestras respiratorias de pacientes hospitalizados según agente etiológico viral. HNN. SE 1-16. Año 2026.

Virus	Frecuencia	Porcentaje
Rhinovirus	341	62.6
Influenza A-B	56	10.3
Adenovirus	54	9.9
Virus respiratorio sincitial	52	9.5
Parainfluenza	29	4.7
Metaneumovirus	9	2.2
Coronavirus	3	0.6
SARS CoV-2	1	0.2
<b>Total</b>	<b>545</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Unidad de Vigilancia Epidemiológica-Laboratorio de microbiología e inmunología. HNN. 2026.



**Gráfico 17.**  
**Distribución de muestras positivas por VRS en pacientes hospitalizados según SE y año. HNN. 2019-2026.**




Fuente: Unidad de Vigilancia Epidemiológica-Laboratorio de microbiología e inmunología. HNN. 2025.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 17, se reportaron un total de 21 casos confirmados, lo que representa un aumento del 110% con respecto a la SE-16 del año 2026 que presentó 10 casos.



### Gráfico 18.

#### Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2026.




Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2026.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 17, se reportó un promedio total de 1 hospitalizado; en la SE-16, hubo un total de 2 pacientes hospitalizados en salón general, lo que representa una disminución del 50% con respecto a la SE-16; en UCI no hubo pacientes internados.

### Gráfico 19.

#### Costa Rica: Hospitalizaciones por Covid-19, según semana epidemiológica año 2026.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2026.



En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 17, no hubo fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

**Gráfico 20.**

**Costa Rica: Fallecidos por COVID-19, según semana epidemiológica año 2026.**




Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2026.

**Variantes genómicas**

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 5 de mayo del 2026, se reporta lo siguiente.

**Gráfico 21.**

**Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 9 del 2026.**



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 5 de mayo del 2026.



## Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 04 de mayo 2026.

### Situación epidemiológica de EDA

En la semana epidemiológica (SE) 16 del año 2026 se registran 149429 casos acumulados de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) a nivel nacional. Para esta semana se notifican 8250 casos, lo que representa aumento en comparación con la SE-15 del año 2025 (5754 casos).

El comportamiento observado se mantiene dentro del patrón estacional esperado para este evento, caracterizado por fluctuaciones asociadas a factores ambientales y conductuales. Entre estos factores se incluyen las variaciones en las condiciones climáticas, la calidad del agua, la manipulación de alimentos y los patrones de consulta de la población relacionados con el retorno progresivo a las actividades educativas y laborales.

Asimismo, es importante considerar que los sistemas de vigilancia pueden presentar rezagos en la notificación, por lo que las cifras correspondientes a las semanas epidemiológicas más recientes podrían encontrarse parcialmente subestimadas. De manera habitual, la consolidación de los registros ocurre al menos tres semanas posteriores a la semana epidemiológica analizada.

De acuerdo con el análisis del canal endémico y la información disponible hasta la SE-16, el comportamiento de EDA se mantiene dentro de los rangos esperados para el período, sin evidenciar desviaciones epidemiológicas significativas. La vigilancia continua permitirá monitorear oportunamente cualquier cambio en la tendencia de la enfermedad durante las semanas siguientes.

### Contexto climático 2026 y EDA

El fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) influye en los patrones de precipitación y temperatura, incidiendo en el comportamiento de eventos de salud pública como las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las enfermedades transmitidas por alimentos y agua.

El análisis comparativo de las semanas epidemiológicas 01 a la 16 evidencia diferencias claras según el contexto climático. Los años con condiciones ENSO neutras con tendencia a La Niña (2023 y 2025) presentan en conjunto un menor número de casos de EDA, con promedios semanales aproximados entre 6.400 y



8.200 casos. En contraste, los años con condiciones ENSO mayormente neutras con posible transición hacia El Niño (2024 y 2026) muestran valores consistentemente más elevados, con promedios que superan los 9.500–10.000 casos semanales.

Particularmente, el año 2024 registra los mayores valores en la mayoría de las semanas. Por su parte, el año 2026 presenta un comportamiento intermedio, con valores altos y sostenidos (ej. semana 14: 11.099), aunque sin superar de forma consistente los máximos observados en 2024.

En términos generales, se observa una mayor carga de EDA en escenarios asociados a transición hacia El Niño, con diferencias que pueden superar el 30–35 % en comparación con los años con tendencia a La Niña.

Este patrón sugiere una influencia importante de las condiciones climáticas en la dinámica de la enfermedad, posiblemente relacionada con cambios en la disponibilidad y calidad del agua, así como en los procesos de manipulación de alimentos y transmisión de agentes infecciosos. En este contexto, el monitoreo del ENSO continúa siendo un insumo clave para el análisis epidemiológico y la toma de decisiones en salud pública.

### **Canal endémico EDA**

Los datos que se presentan son preliminares y se encuentran en proceso de validación, por lo que podrían realizarse ajustes posteriores que modifiquen la posición actual dentro del canal endémico.

El canal endémico de EDA se clasifica en tres zonas de comportamiento: zona de éxito (verde), zona de seguridad (amarillo) y zona de alerta (rojo), construidas a partir de los promedios y límites históricos esperados para este evento. La línea morada representa el comportamiento observado durante el año 2026.

Durante las primeras semanas epidemiológicas del año, la serie correspondiente al 2026 (línea morada) muestra valores que, de forma puntual, se ubican por encima del límite superior del canal endémico, ingresando transitoriamente en la zona de alerta.

Sin embargo, este comportamiento no se mantiene de forma sostenida y, al considerar la variabilidad histórica del evento, los valores observados se mantienen dentro del rango esperado para el periodo. En este contexto, aunque se evidencia una carga elevada de casos en comparación con la zona de éxito y seguridad, no se identifica un incremento inusual ni un comportamiento epidémico del evento.




Este patrón puede estar influenciado por factores ambientales y climáticos, así como por variaciones en la exposición a fuentes de contaminación alimentaria o hídrica. Asimismo, pueden incidir cambios en los patrones de consulta, acceso a servicios de salud y procesos de notificación.

En consecuencia, el evento se mantiene bajo vigilancia epidemiológica intensificada, con seguimiento continuo del comportamiento de la curva en las semanas subsecuentes, con el fin de detectar oportunamente cualquier desviación significativa respecto al patrón histórico esperado.

### Gráfico 1

#### Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 16. Años 2018- 2026 \*



\*Nota: Se excluyen del 2020 y 2021 por la pandemia COVID-19 y 2022 por hackeo de la CCSS.

Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.



## **Análisis territorial y poblacional EDA**

A nivel territorial, se identifican cantones con tasas de incidencia significativamente superiores al promedio nacional (2672,2 por 100 000 habitantes), destacando principalmente Flores (5504,7), San Rafael (4988,3), Orotina (4985,7), Vásquez de Coronado (4938,8), Puntarenas (4903,3), Esparza (4630,8), Alajuelita (4375,3), Santa Cruz (4360,0), Mora (4347,8), Naranjo (4334,3) y Montes de Oro (4278,5), los cuales presentan los valores más elevados a nivel nacional.

Asimismo, otros cantones como Goicoechea (4172,8), Garabito (4016,4), Tarrazú (3987,3), Cañas (3931,5) y San José (3888,7) también muestran tasas elevadas, lo que refuerza el patrón observado y sugiere la persistencia de focos territoriales con mayor transmisión o exposición.

Si bien algunos de estos cantones no coinciden de forma consistente con los territorios históricamente priorizados, sí evidencian focos actuales de alta incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), lo que respalda la necesidad de un seguimiento epidemiológico focalizado y análisis de determinantes locales.

Se observa un predominio territorial en cantones de la provincia de Heredia, particularmente Flores, San Rafael, Barva (3023,4) y Santo Domingo (3144,0), los cuales presentan tasas elevadas dentro del conjunto analizado. Asimismo, destacan cantones de las regiones Pacífico Central y Chorotega, como Puntarenas, Esparza, Orotina, Garabito, Parrita (3624,3), Quepos (3402,8), Santa Cruz, Nandayure (3712,9) y Cañas, caracterizados por valores altos que podrían estar asociados a dinámicas costeras, movilidad poblacional, actividad turística y factores ambientales.


De igual forma, se identifican cantones del Gran Área Metropolitana, entre ellos Alajuelita, Vásquez de Coronado, Mora, San José, Goicoechea y Desamparados (3166,3), donde la alta densidad poblacional, concentración de servicios y movilidad urbana podrían influir en los niveles de incidencia observados.

En cuanto a la carga acumulada de casos, las Regiones Rectoras con mayor contribución corresponden a Pacífico Central, Central Sur, Central Norte y Chorotega, las cuales concentran una proporción importante del total de casos de EDA a nivel nacional.



## Gráfico 2

### Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según provincia. SE 16, 2026.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

La distribución por grupos etarios muestra un patrón bimodal en la afectación de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).

Por un lado, los grupos de menor edad, particularmente los menores de 5 años presentan tasas elevadas, destacando el grupo de 1 a 4 años (4760,0 por 100 000 habitantes) y los menores de 1 año (4132,2), lo que evidencia su alta vulnerabilidad biológica y factores asociados al entorno, tales como mayor susceptibilidad inmunológica, exposición intradomiciliar y condiciones sanitarias.

Por otro lado, se identifica una importante carga de enfermedad en adultos jóvenes, especialmente en el grupo de 20 a 24 años (5113,2 por 100 000 habitantes), seguido de 25 a 29 años (4597,5) y 30 a 34 años (3755,2). Este comportamiento podría estar relacionado con una mayor movilidad poblacional, exposición ocupacional, consumo frecuente de alimentos fuera del hogar y mayor interacción social.

A partir de los 40 años se observa una disminución progresiva de las tasas, pasando de 2636,3 en el grupo de 40 a 44 años a 1310,7 en personas de 65 años y más, lo que podría sugerir menor exposición relativa, cambios en hábitos de consumo o desarrollo de inmunidad frente a determinados agentes infecciosos.

Adicionalmente, al analizar por sexo, se observa que las tasas son consistentemente mayores en el sexo femenino a nivel general (3093,6 vs 2627,9) y en la mayoría de los grupos de edad, especialmente en adultos jóvenes, como en el grupo de 20 a 24 años (5553,9 en mujeres vs 4685,6 en hombres) y 25 a 29 años (5120,4 vs 4088,1).



No obstante, en los grupos infantiles se observa un patrón inverso, con tasas más elevadas en hombres, como en menores de 1 año (4347,3 vs 3906,3) y 1 a 4 años (4977,8 vs 4532,8).

Este comportamiento poblacional resalta la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control sanitario, priorizando intervenciones en los grupos con mayor incidencia relativa, particularmente población infantil y adultos jóvenes, así como reforzar estrategias relacionadas con la calidad del agua, la inocuidad de los alimentos y la detección oportuna de brotes.

### **Conclusión EDA**

Resulta esencial reforzar el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, así como la promoción de prácticas adecuadas de higiene personal, la manipulación segura de alimentos y la correcta cocción de estos, como medidas fundamentales para la prevención de la EDA.

Estas acciones adquieren especial relevancia ante la persistencia de casos de diarrea aguda reportados por el sistema de salud, tanto de origen viral como bacteriano, los cuales continúan representando una carga significativa para la salud pública, particularmente en los territorios con mayor incidencia y carga acumulada del evento.

En este contexto, cobra especial importancia la aplicación rigurosa del Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), el cual orienta la investigación oportuna de casos y brotes, incluyendo el uso de flujogramas específicos según la etiología probable. El fortalecimiento de las actividades de vigilancia activa, la investigación de campo y la respuesta inmediata ante alertas locales son elementos clave para contener la transmisión, identificar factores de riesgo y reducir la carga de enfermedad en las comunidades más afectadas.



## Infecciones de transmisión sexual

La notificación de las infecciones de transmisión sexual (ITS) es de carácter obligatorio, según lo establecido en el Decreto N.° 40556-S. En este marco, la vigilancia epidemiológica semanal de las ITS constituye una herramienta fundamental para el monitoreo de tendencias, la detección temprana de variaciones en la incidencia y la activación oportuna de medidas de control.


En cumplimiento de este mandato, se presenta el informe correspondiente al comportamiento de la sífilis en todas sus formas, gonorrea, la infección por el virus del herpes simple y la infección por el virus del papiloma humano durante las primeras quince semanas del año 2026.

### Sífilis en todas sus formas

En las primeras 16 semanas del año 2026, se notificaron 1021 casos con una tasa 19,20 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2025 se notificaron 1031 casos, lo que representa un descenso para el año en curso del 1,36% con 14 casos. En el Gráfico 1, se presentan los datos distribuidos, según el reporte semanal.

#### Gráfico 1.

**Costa Rica: Casos notificados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2025 y 2026**



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados semanalmente.


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.



Durante las primeras 16 semanas del año 2026, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad mostró que el 59,16% de los casos (604 de 1021) corresponde a los hombres, con una tasa de 23,20 por cada 100 000 habitantes. En el caso de las mujeres, se reportó el 40,84% de los casos (417 de 1021), con una tasa 16,00 por cada 100 000 habitantes.

Los casos de sífilis, en todas sus formas en las primeras 16 semanas a nivel nacional, mostraron una mayor notificación en el grupo de edad de 20 a 29 años, el cual concentró el 26 % de los casos (267 de 1021), al igual que el grupo de 30 a 39 años, con un 26 % (267 de 1021), y por el grupo de 40 a 49 años, que representó el 17 % (174 de 1021) de los casos notificados. En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los casos de sífilis en todas sus formas, según grupos etarios. Es relevante indicar que los grupos con 20 a 49 años representa el 69 % de los casos notificados, por ende, se debe continuar fortaleciendo, las estrategias de prevención en esta población sexualmente activa, diagnósticos oportunos y brindar educación sexual.

**Gráfico 2.**  
**Costa Rica: Notificación de casos de sífilis en todas sus formas por grupos de edad, en semanas epidemiológicas 1 a16 del 2026, según tasa por 100 000 habitantes**



Nota: Datos preliminares sujetos a revisión y actualización semanal.  
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.



En la tabla 1, se presenta el comportamiento de la sífilis en todas sus formas por provincias de residencia.

**Tabla 1.**  
**Costa Rica: Notificación de casos de sífilis en todas sus formas, según provincias de procedencia, durante las semanas 1 a 16 del 2026. Tasa por 100 000 habitantes**

Provincia	Casos	Tasa
Total	1021	19,20
San José	453	27,18
Alajuela	115	10,6
Cartago	117	21,9
Heredia	79	14,3
Guanacaste	34	8,2
Puntarenas	67	13,2
Limón	156	34,1

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión y actualización semanal.

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.


### **Infección por gonorrea**

En las primeras 16 semanas del año 2026, se notificaron 435 casos con una tasa 8,30 por 100 000 habitantes. En el año 2025 en el mismo periodo se notificaron 520 personas, lo que representa para el año en curso un descenso del 16,34% con 85 casos. En el Gráfico 3 se presentan los datos distribuidos, según el reporte semanal.



### Gráfico 3

Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2025 y 2026



Nota: Datos preliminares sujeto a ser actualizado semanalmente.

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.


Durante las primeras 16 semanas del año 2026, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad mostró que el 85,98% (374 de 435) de los casos en los hombres, con una tasa 14,40 por cada 100 000 habitantes. En el caso de las mujeres, se reportó el 14,02% de los casos (61 de 435), con una tasa de 2,3 por cada 100 000 habitantes.

Los casos de gonorrea durante las primeras 16 semanas a nivel nacional, mostraron una mayor notificación en el grupo de edad de 20 a 29 años, el cual concentró el 49,00 % de los casos (213 de 435). Este grupo fue seguido por las personas de 30 a 39 años, con un 19,5 % (85 de 435), y por el grupo de 40 a 49 años, que representó el 9,9 % (43 de 435) de los casos notificados. En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los casos de gonorrea por grupos etarios. Es relevante indicar que estos grupos de 20 a 49 años representa el 78,40 % de los casos notificados, por ende, se debe continuar fortaleciendo, las estrategias de prevención en esta población sexualmente activa, diagnósticos oportunos y brindar educación sexual.



Gráfico 4

Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad número absoluto, y tasa por 100 000 habitantes, durante las primeras 16 semanas del año 2026



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados semanalmente.

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

En la tabla 2, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Tabla 2

Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa por 100 000 habitantes, en las primeras 16 semanas año 2026

Provincia	Casos	Tasa
Total	435	8,30
San José	202	12,1
Alajuela	46	4,2
Cartago	28	5,2
Heredia	42	7,6
Guanacaste	9	2,2
Puntarenas	44	8,6
Limón	64	14,0

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizado semanalmente.

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.




## Infección por el virus del herpes simple (VHS)

En las primeras 16 semanas del año 2026, se notificaron 264 casos con una tasa de 5,10 por 100 000 habitantes. En el año 2025 en el mismo periodo se notificaron 307 casos, lo que representa para el año en curso un descenso del 14,00% con 43 casos. En el Gráfico 5 se presentan los datos distribuidos, según el reporte semanal.

### Gráfico 5.

**Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes simple, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, durante los años 2025 y 2026**



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados semanal.

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

Durante las primeras 16 semanas del año 2026, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad mostró que la notificación en las mujeres fue del 65,53 % (173 de 264) de los casos con una tasa de 6,6 por cada 100 000 habitantes. En el caso de los hombres, se reportó el 34,47 % (91 de 264) de los casos con una tasa de 3,5 por cada 100 000 habitantes.


Los casos de la infección por el virus del herpes simple durante las primeras 16 semanas a nivel nacional, mostraron una mayor notificación en el grupo de edad de 20 a 29 años, el cual concentró el 30,30 % de los casos (80 de 264). Este grupo fue seguido por las personas de 30 a 39 años, con un 25,8 % (68 de 264), y por el grupo de 40 a 49 años, que representó el 14,8 % (39 de 264) de los casos notificados. En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los casos de VHS por grupos etarios. Es relevante indicar que estos grupos de 20 a 49 años representa el 78,50 %



de los casos notificados, por ende, se debe continuar fortaleciendo, las estrategias de prevención en esta población sexualmente activa, diagnósticos oportunos y brindar educación sexual.

**Gráfico 6.**

**Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes simple, por grupos de edad en las semanas 1 a 16 del 2026. Tasa por 100 000 habitantes**



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizado semanalmente.

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

En la tabla 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país

**Tabla 3**

**Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes simples, según provincias de procedencia, durante las primeras 16 semanas del año 2026. Tasa por 100 000 habitantes**

Provincias	Casos	Tasa
Total	264	5,1
San José	135	8,10
Alajuela	36	3,32
Cartago	13	2,44
Heredia	27	4,90
Guanacaste	5	1,20
Puntarenas	23	4,52
Limón	25	5,46

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizado semanalmente.

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS,



## Miasis por gusano barrenador en humanos


A continuación, se presentan los datos preliminares de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 17 del año 2026, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2026 a la SE 17, se tienen los siguientes datos:

- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 34 casos
- Casos por grupos de edad tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (14/34) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (20/34)

### Gráfico 1

Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 17, 2026




Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026



## Gráfico 2

### Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 17, 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2026, presenta un predominio en los hombres con 25 casos notificados con una tasa de 1,0 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 9 casos notificados con una tasa de 0,3 por 100.000 habitantes.

## Tabla 1

### Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 17, 2026

Provincias	Casos	Tasas
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>0,7</b>
San José	7	0,4
Alajuela	5	0,5
Cartago	1	0,2
Heredia	4	0,7
Guanacaste	5	1,2
Puntarenas	9	1,8
Limón	3	0,7


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026



En la tabla 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por número de casos notificados a la SE 17 según provincia de procedencia, presentando mayor número de casos la provincia de Puntarenas (9/34) seguida de la provincia de San José (7/34).

### Gráfico 3

**Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 17, 2026**




Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En el gráfico 3 se muestra el comportamiento de esta enfermedad en las nueve regiones del Ministerio de Salud, destacándose la región Pacífico Central como la que registra el mayor número de casos notificados (6/34).

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 17 del 2025 y 2026, con un total de 34 casos confirmados por esta enfermedad para el 2026, siendo que para la SE 17 del 2025 se confirmaron 38 casos de miasis por gusano barrenador en el país.



**Gráfico 4**  
**Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 17 del 2025 y del 2026**



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025 y 2026

En atención a la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación del Gusano Barrenador (*Cochliomyia hominivorax*), establecida mediante el Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG, y considerando que la mosca continúa circulando en el territorio nacional, resulta de suma importancia que, ante la detección de un caso sospechoso en humanos, se active de manera inmediata la coordinación interinstitucional e intersectorial bajo el enfoque de **Una Sola Salud**.

Dicha coordinación involucra la participación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), según corresponda. El propósito es identificar oportunamente casos sospechosos en humanos y/o animales y garantizar su atención conforme a lo establecido en el **Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos**.



A continuación, se presentan las disposiciones generales para la prevención y control de la enfermedad:

- Mantener una adecuada higiene personal, incluyendo el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Realizar el control, tratamiento y cuidado higiénico de las lesiones conforme a las indicaciones del médico tratante.
- Acudir oportunamente a los servicios de salud públicos o privados ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, tales como dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión.
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, efectuando revisiones periódicas y la curación de todas las heridas. Asimismo, se deberá notificar a las autoridades de salud animal (MAG-SENASA y/o MINAE) la aparición de animales con gusaneras, a fin de garantizar su atención oportuna.